



Ежегодно в мире совершается около 1 млн. самоубийств, примерно в 10 раз больше предпринимается суицидальных попыток. Самоубийство, как причина смерти, в возрасте 15-35 лет занимает в Европейском регионе второе место после дорожно-транспортных происшествий. Среднемировой уровень суицидов колеблется в пределах 14-16 человек на 100 тысяч населения. В нашей республике этот показатель выше - около 20 случаев на 100 тысяч.

Уровень суицидов увеличивается с возрастом, и достигает максимума после 45-50 лет, хотя большинство суицидальных попыток приходится на молодой возраст - 20-29 лет.

Частота суицидальных попыток среди женщин выше примерно в 1,5 раза, чем у мужчин, но мужчины, наоборот, в 3-6 раз чаще совершают их, чем женщины.

ФАКТОРЫ РИСКА суицидального поведения

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: нарушенные детско-родительские и партнерские отношения, одиночество и другие.

ТАЖЕЛЫЕ КРИЗИСЫ: смерть близких, развод, финансовые потери, уголовная ответственность, потеря работы, значительное снижение социального статуса, тяжелые конфликты и другие кризисы могут также стать пусковыми факторами суицидального поведения.

ТАЖЕЛЫЕ ХРОНИЧЕСКИЕ СОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, приносящие массу страданий и социальных ограничений: онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция, потеря органа или телесной функции и др.

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.

Во многих случаях состояние человека на момент смерти в результате суицида соответствует диагнозу какого-либо психического расстройства. Наиболее частые из них - депрессия, провоцирующая 45-70% суицидов; зависимость от алкоголя, наркотиков - 10-22%; расстройства личности и другие.



Симптомы ДЕПРЕССИИ

- **Снижение настроения:** потухший взгляд, задержка дыхания, тяжелые вздохи, необщительность, молчаливость, высказывания об отсутствии надежды, перспектив, смысла жизни.
- **Снижение интереса к обычным для данного человека занятиям, контактам и развлечениям.** Человек много времени проводит в постели, ничем не интересуется, избегает общения, просмотра телепередач, чтения и др.
- **Снижение, работоспособности, повышение утомляемости.** Человек обвиняет себя за слабость воли, считает никому не нужным, никчемным.
- **Снижение самооценки и потеря уверенности в себе.** Свое прошлое, настоящее и будущее человек воспринимает как череду прошедших и предстоящих неудач, в которых винит только себя.
- **Чрезмерное чувство вины, беспричинное порицание себя.** Субъект обвиняет себя в реальных и надуманных неудачах, берет на себя вину за события в жизни близких, а иногда и незнакомых людей.
- **Повторяющиеся мысли и высказывания о смерти, самоубийстве. Суицидальные акты.**

- **Нарушение концентрации внимания, снижение памяти, чувство интеллектуальной неполноценности.**

У человека может появиться ощущение, что его умственные способности необратимо снижаются и он болен каким-либо тяжелым заболеванием мозга. С уменьшением интенсивности депрессии эти симптомы проходят.

- **Нерешительность, чрезмерные колебания** в выборе даже незначительного решения.

▪ **Заторможенность, снижение двигательной активности.** Реже - беспокойство, повышение двигательной активности.

▪ **Нарушения сна.** Затруднения в засыпании, пробуждения по ночам, ранние пробуждения, отсутствие удовлетворенности ночным сном, чувство постоянной мыслительной работы по ночам. Бессонница в ранние утренние часы может сопровождаться тягостными тревожными переживаниями с суицидальными мыслями.



- **Понижение или повышение аппетита.**

Значительное понижение аппетита и потеря веса говорят о тяжести состояния. В некоторых случаях повышение аппетита и увеличение веса может служить компенсацией отсутствия удовлетворения в других жизненных сферах. Учащение употребления алкоголя также может говорить о безуспешных попытках «ухода» от тяжелых чувств.

- **Снижение полового влечения, уменьшение потребности в сексуальной сфере.**

▪ **Соматические симптомы:** задержка стула, сухость во рту, колебание артериального давления.